

第2類医薬品

漢方製剤

せい か ご しゃ じん き がん
精 華 牛 車 腎 気 丸

八ッ目製薬株式会社

本剤は、中国宋代に著された《蔵氏濟生方》の水腫論治に記載されている「加味腎気丸」の処方に基づくもので、腎気丸（別名：八味地黄丸）に牛膝と車前子を加えたものです。本剤は、体力中等度以下で、疲れやすくて、四肢が冷えやすく尿量減少し、むくみがあり、ときに口渇がある方の下肢痛、腰痛、しびれ、高齢者のかすみ目、かゆみ、排尿困難、頻尿、むくみ、高血圧に伴う随伴症状の改善（肩こり、頭重、耳鳴り）に効果があります。



使用上の注意



相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。
 - 医師の治療を受けている人
 - 妊婦又は妊娠していると思われる人
 - 胃腸が弱く下痢しやすい人
 - のぼせが強く赤ら顔で体力の充実している人
 - 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人
- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

| 関係部位 | 症 状 |
|-------|------------------|
| 皮 膚 | 発疹・発赤、かゆみ |
| 消 化 器 | 食欲不振、胃部不快感、腹痛 |
| そ の 他 | 動悸、のぼせ、口唇・舌のしびれ* |

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けて下さい。

| 症状の名称 | 症 状 |
|-------|--|
| 間質性肺炎 | 階段を上ったり、少し無理をしたりすると息切れがする・息苦しくなる、空せき、発熱等がみられ、これらが急にあらわれたり、持続したりする。 |
| 肝機能障害 | 発熱、かゆみ、発疹、黄疸（皮膚や白目が黄色くなる）、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。 |

- 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

下痢

- 1ヵ月位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

【効能・効果】

体力中等度以下で、疲れやすくて、四肢が冷えやすく尿量減少し、むくみがあり、ときに口渇があるものの次の諸症：

下肢痛、腰痛、しびれ、高齢者のかすみ目、かゆみ、排尿困難、頻尿、むくみ、高血圧に伴う随伴症状の改善（肩こり、頭重、耳鳴り）

【用法・用量】

次の量を1日3回水又は白湯で服用して下さい。

| 年 齢 | 1回量 | 1日服用回数 |
|----------------|---------|--------|
| 大 人 (15歳以上) | 8丸 | 3回 |
| 15歳未満 | 服用しないこと | |

〈用法・用量に関連する注意〉

用法及び用量を厳守して下さい。

【成分】

大人（15歳以上）1日の服用量24丸中に下記成分及び分量より得た牛車腎気丸料エキス末（「症候別治療」、1/2量）2.4gを含んでいます。

| 成 分 | 含有量 | 成 分 | 含有量 |
|-----------|------|---------|-------|
| ジ オ ウ | 2.5g | ポ タ ン ピ | 1.5g |
| サ ン シ ュ ユ | 1.5g | ケ イ ヒ | 0.5g |
| サ ン ヤ ク | 1.5g | ゴ シ ツ | 1.5g |
| タ ク シ ャ | 1.5g | シャゼンシ | 1.5g |
| ブ ク リ ョ ウ | 1.5g | ブ シ | 0.25g |

添加物として、バレイショデンプン、カッセキを含有します。

〈成分に関連する注意〉

本剤は天然物（生薬）を用いていますので、丸薬の色や味が多少異なることや、丸薬がくっつくことがあります。

【保管及び取扱い上の注意】

- （1）直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管して下さい。
- （2）小児の手のとどかない所に保管して下さい。
- （3）他の容器に入れ替えないで下さい。
（誤用の原因になったり品質が変わります。）
- （4）使用期限を過ぎた製品は服用しないで下さい。

本剤についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記をお願いいたします。

八ッ目製薬株式会社（お客様相談室）

電 話 (03)3680-0005

受付時間 9:00～17:00（土・日、祝日を除く）

製造販売元

八ッ目製薬株式会社

東京都江戸川区船堀2-14-14（〒134-0091）