

* 2012年6月

(記載要領変更に伴う改訂)

御使用に際して、この説明文書を必ずお読み下さい。
また、必要な時に読めるように大切に保管して下さい。

第2類医薬品

生薬製剤

けっ ぶ ちく お か りゅう
血 府 逐 瘀 顆 粒®

ハツ目製薬株式会社

本剤は、中国清代に著された《医林改錯》に記載されている「血府逐瘀湯」の処方に基づくものです。中年以降又は高血圧傾向の方の頭痛、頭重、肩こり、のぼせ、動悸の改善に効果があります。



使用上の注意



相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。
 - 医師の治療を受けている人
 - 妊婦又は妊娠していると思われる人
 - 胃腸が弱く下痢しやすい人
- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

関係部位	症 状
消 化 器	食欲不振、胃部不快感*
そ の 他	異常出血

- 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

軟便、下痢
- 1ヵ月位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

【効能・効果】

中年以降又は高血圧傾向のあるものの
次の諸症：頭痛、頭重、肩こり、のぼせ、動悸

【用法・用量】

次の量を1回1包、1日3回、水又は白湯で服用して下さい。

年 齢	1回量	1日服用回数
成 人 (15歳以上)	1包	3回
15歳未満	服用しないこと	

【成分】

成人（15歳以上）1日の服用量3包中、次の成分を含んでいます。

血府逐瘀丸料エキス末 3.0g

成分	含有量	成分	含有量
トウキ	1.98g	シャクヤク	1.32g
センキュウ	0.99g	サイコ	0.66g
ジオウ	1.98g	カンゾウ	0.66g
トウニン	2.64g	キキョウ	0.99g
コウカ	1.98g	ゴシツ	1.98g
キジツ	1.32g		

血府逐瘀湯末 1.5g

成分	含有量	成分	含有量
トウキ	0.18g	シャクヤク	0.12g
センキュウ	0.09g	サイコ	0.06g
ジオウ	0.18g	カンゾウ	0.06g
トウニン	0.24g	キキョウ	0.09g
コウカ	0.18g	ゴシツ	0.18g
キジツ	0.12g		

添加物として、乳糖、ステアリン酸マグネシウムを含有します。

〈成分に関連する注意〉

本剤は天然物（生薬）を用いていますので、顆粒の色や味が多少異なることがあります。

【保管及び取扱い上の注意】

- （1）直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管して下さい。
- （2）小児の手のとどかない所に保管して下さい。
- （3）他の容器に入れ替えないで下さい。
（誤用の原因になったり品質が変わります。）
- （4）使用期限を過ぎた製品は服用しないで下さい。

本剤についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願いいたします。

八ッ目製薬株式会社（お客様相談室）

電話 (03)3680-0005

受付時間 9:00～17:00（土・日、祝日を除く）

製造販売元

八ッ目製薬株式会社

東京都江戸川区船堀2-14-14（〒134-0091）