

## 「降圧丸」使用上の注意・保管及び取扱い上の注意改訂のお知らせ

このたび、日本漢方生薬製剤協会からの自主申し合わせ等により、弊社一般用医薬品の「降圧丸」の「使用上の注意」及び「保管及び取扱い上の注意」につきまして下記の通り自主改訂することとなりましたのでご連絡いたします。

服用に際しましては、お求めの製品に封入されている説明文書の「使用上の注意」及び「保管及び取扱い上の注意」とあわせて必ずお読み下さいますよう、お願い申し上げます。

ハツ目製薬株式会社

記

「使用上の注意」及び「保管及び取扱い上の注意」の改訂内容：下線部を改訂しました。

改訂後 (新)	<p><b>使用上の注意</b> 相談すること</p> <p><b>1. 次の人は服用前に、医師又は薬剤師に相談して下さい。</b></p> <p>(1) 医師の治療を受けている人 (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人 (3) <u>体の虚弱な人（体力の衰えている人、体の弱い人）*</u> (4) <u>胃腸が弱く下痢しやすい人*</u> (5) 体が冷える傾向の人 (6) <u>本人又は家族がアレルギー体質の人*</u> (7) <u>薬によりアレルギー症状やぜんそくを起こしたことがある人*</u> (8) 次の症状のある人     下痢、高熱 (9) 次の医薬品を服用している人     瀉下薬（下剤）</p> <p><b>2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談して下さい。</b></p> <p>(1) 服用後、次の症状があらわれた場合</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-bottom: 5px;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">関係部位</th> <th>症 状</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>消化器</td> <td>食欲不振、胃部圧迫感、はげしい腹痛を伴う下痢、腹痛</td> </tr> <tr> <td>皮 膚*</td> <td>発疹・発赤、かゆみ*</td> </tr> <tr> <td>その他*</td> <td>ぜんそく*</td> </tr> </tbody> </table> <p>(2) 1ヶ月位服用しても症状がよくなる場合</p> <p><b>【保管及び取扱い上の注意】</b></p> <p>(1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管して下さい。 (2) 小児の手のとどかない所に保管して下さい。 (3) 他の容器に入れ替えないで下さい。（誤用の原因になったり品質が変わります。） (4) 本剤は湿気などの影響により薬が変質することがあるので、次のことに注意して下さい。     1) 服用のつどフタをよくしめること。     2) 直接手に薬剤をとらないこと。（キャップなどにとり分ける。）* (5) 使用期限を過ぎた製品は服用しないで下さい。</p>	関係部位	症 状	消化器	食欲不振、胃部圧迫感、はげしい腹痛を伴う下痢、腹痛	皮 膚*	発疹・発赤、かゆみ*	その他*	ぜんそく*
関係部位	症 状								
消化器	食欲不振、胃部圧迫感、はげしい腹痛を伴う下痢、腹痛								
皮 膚*	発疹・発赤、かゆみ*								
その他*	ぜんそく*								
改訂前 (旧)	<p><b>使用上の注意</b> 相談すること</p> <p><b>1. 次の人は服用前に、医師又は薬剤師に相談して下さい。</b></p> <p>(1) 医師の治療を受けている人 (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人 (3) 胃腸の虚弱な人 (4) 体が冷える傾向の人 (5) 今までに薬により発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人 (6) 次の症状のある人     下痢、高熱 (7) 次の医薬品を服用している人     瀉下薬（下剤）</p> <p><b>2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談して下さい。</b></p> <p>(1) 服用後、次の症状があらわれた場合</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-bottom: 5px;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">関係部位</th> <th>症 状</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>消化器</td> <td>食欲不振、胃部圧迫感、はげしい腹痛を伴う下痢、腹痛</td> </tr> </tbody> </table> <p>(2) 1ヶ月位服用しても症状がよくなる場合</p> <p><b>【保管及び取扱い上の注意】</b></p> <p>(1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管して下さい。 (2) 小児の手のとどかない所に保管して下さい。 (3) 他の容器に入れ替えないで下さい。（誤用の原因になったり品質が変わります。） (4) 使用期限を過ぎた製品は服用しないで下さい。</p>	関係部位	症 状	消化器	食欲不振、胃部圧迫感、はげしい腹痛を伴う下痢、腹痛				
関係部位	症 状								
消化器	食欲不振、胃部圧迫感、はげしい腹痛を伴う下痢、腹痛								